

PROCEDIMENTO

Enzima de Emagrecimento PERCA DE PESO 1 - TCC

CATEGORIA

Estética

PÚBLICO

Equipe

SEÇÕES

1

Conteúdo

1- Objetivo

A técnica consiste na aplicação intramuscular de ativos lipolíticos que irão auxiliar na perda de peso, aumentando o metabolismo endógeno, contribuindo para a queima da reserva energética, favorecendo a perda de peso. Além disso, contribuiu para o aumento da disposição física e energia para prática de esportes.

2- Áreas de Aplicação Glúteo - VIA INTRAMUSCULAR. 3- Responsabilidades Biomédicas.

4- Ativos:

Colina 200mg + Inositol 200mg + Taurina 200mg + LipoLess 200mg (Vitb12 1mg + Metionina 50mg + Inositol 75mg + Colina 75mg) + L-Carnitina 600mg + L-Fenilalanina 50mg/10ml. 5- Materiais / Equipamentos Necessários Descrição Quant. Mínima. (unid.) Enzima PERCA DE PESO 1 (TCC) 1 Agulha 18G 1 Agulha 27G 1 Seringas de 10 ml 1 Gaze/algodão 1 Luva de Vinil 1 Álcool 70% 1 6- Descritivo da Execução

1. Verificar se todos os materiais necessários estão na sala;
2. Chamar cliente pelo nome, cumprimentar com simpatia usando "bom dia", "bom tarde" ou "boa noite";
3. Apresentar-se ao cliente;
4. Encaminhar o cliente para a sala certificar-se que o cliente está ciente da dieta necessária para o bom resultado;
5. Realizar medidas e tirar o peso do paciente.
6. Calçar as luvas;
7. Aspirar o conteúdo do frasco com uma agulha 18G na seringa de 10ml, o mesmo deve ser aberto na frente do cliente;
8. Descartar a agulha 18G no descartpack e encaixar a agulha 27G na seringa já com os ativos;
9. Realizar assepsia do local da aplicação com álcool 70%;
10. Iniciar a aplicação com a agulha 27G intramuscular (respeitar volume máximo de 5ml para cada lado do glúteo) - ASPIRAR ANTES DE APLICAR;
11. Finalizar a aplicação e colar um stoper no ponto de aplicação;
12. Descartar seringas, luvas e gaze (lixo infectante) e agulhas (descartpack);
13. Agradecer a presença e certificar-se da satisfação do atendimento;
14. Higienizar a maca com álcool 70%.

7- Frequencia:

Pode ser aplicado 1 ou 2x na semana.

8- Indicações ã Redução de peso. 9- Contraindicações:

ã Hipersensibilidade ao produto; ã Hipertensos; ã Presença de processo inflamatório ou infeccioso no local; ã Gravidez e amamentação; 10- Anexos Figura 1: Perda de peso 1 (TCC) - Laboratório PHD. Figura 2. Indicação de ponto de aplicação glutea.

