

PROCEDIMENTO

Enzima de Emagrecimento - REDUTOR DE APETITE

PÚBLICO

Equipe

CATEGORIA

Estética

SEÇÕES

1

Conteúdo

1- Objetivo

A técnica consiste na aplicação intramuscular de ativos lipolíticos que irão auxiliar na perda de peso saudável, diminuindo a compulsão alimentar e aumentando o metabolismo endógeno, contribuindo para a queima de reserva energética, favorecendo a perda de peso. Aumenta o funcionamento hepático na diminuição da metabolização lipídica.

2- Áreas de Aplicação

Glúteo - VIA INTRAMUSCULAR.

3- Responsabilidades

Biomédicas.

4- Ativos:

L-Theanina 50mg + Inositol 200mg + Taurina 200mg + LipoLess 200mg (Vitb12 1mg + Metionina 50mg + Inositol 75mg + Colina 75mg) + L-Carnitina 600mg + L-Fenilalanina 50mg/10ml

5- Materiais / Equipamentos Necessários

Descrição Quant. Mínima. (unid.)

Enzima PERCA DE PESO 2 (E10) 1

Agulha 18G 1

Agulha 27G 1

Seringas de 10 ml 1

Gaze/algodão 1

Luva de Vinil 1

Álcool 70% 1

6- Descritivo da Execução

1. Verificar se todos os materiais necessários estão na sala;
2. Chamar cliente pelo nome, cumprimentar com simpatia usando "bom dia", "bom tarde" ou "boa noite";
3. Apresentar-se ao cliente;
4. Encaminhar o cliente para a sala certificar-se que o cliente está ciente da dieta necessária para o bom resultado;

5. Realizar medidas e tirar o peso do paciente.
 6. Calçar as luvas;
 7. Aspirar o conteúdo do frasco com uma agulha 18G na seringa de 10ml, o mesmo deve ser aberto na frente do cliente;
 8. Descartar a agulha 18G no descartpack e encaixar a agulha 27G na seringa já com os ativos;
 9. Realizar assepsia do local da aplicação com álcool 70%;
 10. Iniciar a aplicação com a agulha 27G intramuscular (respeitar volume máximo de 5ml para cada lado do glúteo)
- ASPIRAR ANTES DE APLICAR;
 11. Finalizar a aplicação e colar um stoper no ponto de aplicação;
 12. Descartar seringas, luvas e gaze (lixo infectante) e agulhas (descartpack);
 13. Agradecer a presença e certificar-se da satisfação do atendimento;
 14. Higienizar a maca com álcool 70%.
- 7- Frequencia:
Pode ser aplicado 1 ou 2x na semana.
- 8- Indicações
• Redução de peso.
- 9- Contraindicações:
• Hipersensibilidade ao produto;
• Hipertensos;
• Presença de processo inflamatório ou infeccioso no local;
• Gravidez e amamentação;
- 10- Anexos Figura 1: Perda de peso 2 (E10) - Laboratorio PHD. Figura 2. Indicação de ponto de aplicação glútea.

