

PROCEDIMENTO

**INTRADERMOTERAPIA - GORDURA LOCALIZADA** Estética

CATEGORIA

PÚBLICO

**Equipe**

SEÇÕES

**1**

## Conteúdo

1- Objetivo A técnica consiste na aplicação de ativos lipolíticos nas regiões que apresentam adiposidade com o objetivo de redução da gordura existente no local. Por seu mecanismo de ação agir diretamente na célula gordurosa, há diminuição da quantidade de gordura. 2- Áreas de Aplicação Abdômen, interno de coxa, culotes, flancos, braços, 3- Responsabilidades Biomédicas.

4- Materiais / Equipamentos Necessários Descrição Quant. Mínima. (unid.)

1. Mescla lipolítica estéril (conforme protocolo do paciente).
2. Seringa descartável (1ml, 3ml ou 5ml).
3. Agulha de aspiração (18G ou 21G) e agulha de aplicação (30G ou 32G - 4mm a 13mm).
4. Álcool 70%, algodão ou gaze estéril.
5. Luvas de procedimento e EPIs.
6. Caixa para descarte de perfurocortantes (Grupo E).

5- Descritivo da Execução

1. Verificar se todos os materiais necessários estão na sala e feito a devida assepsia dos frascos e utensílios que serão utilizados;
2. Chamar cliente pelo nome, cumprimentar com simpatia usando "bom dia", "boa tarde" ou "boa noite";
3. Apresentar-se ao cliente;
4. Encaminhar o cliente para a sala;
5. Realizar anamnese;
6. Orientar como será realizado o tratamento e quais os cuidados após;
7. Realizar as medidas, fazer o registro fotográfico da região e posicioná-lo na maca;
8. Frizar para o cliente que pode ocorrer hematomas e inchaço após a aplicação;
9. Calçar as luvas para iniciar o procedimento;
10. Assepsia e delimitação das regiões;
11. Aspirar o conteúdo do frasco que deve ser aberto na frente do cliente com a agulha 18G na seringa;
12. Iniciar a aplicação com a agulha 30G 1/2.
13. A infiltração do produto é feita pontualmente, a quantidade de medicamento depende da indicação do laboratório, da mescla e da expertise profissional;

14. Respeitar sempre a sensibilidade do paciente, caso seja necessário fazer pausa entre as aplicações, ou utilizar gelo para amenizar o desconforto;
  15. Finalizada a aplicação higienizar novamente a região para que não fique nenhuma marca ou sangue;
  16. Redizer as orientações após a aplicação e garantir que o paciente entendeu e não ficou nenhuma dúvida.
  17. Descartar luva e seringas no lixo contaminado e os perfurocortante no descarpack.
  18. Orientar o paciente que em 48 horas o cliente deve retornar para realizar uma sessão de heccus ou de drenagem manual;
- 6- Intervalo de sessões
1. De acordo com a orientação profissional;
- 6- Indicações
1. Redução de gordura localizada.
- 7- Contraindicações
1. Gestantes e lactantes.
  2. Infecções no local da aplicação.
  3. Doenças autoimunes descompensadas.
  4. Alergia a componentes (ex: soja, se houver fosfatidilcolina).
- 8- Possíveis intercorrências
1. Edema, eritema e equimoses (comuns).
  2. Nódulos inflamatórios ou necrose tecidual (por aplicação superficial ou excesso de volume).
- 9- Anexos Figura 1: Ângulo de Aplicação. Figura 2: Locais de aplicação.  
Figura 3. Enzimas lipolíticas Laboratorio PHD

