

PROCEDIMENTO

**BIOESTIMULADOR DE COLAGENO SCULPTRA**

PÚBLICO

**Equipe**

CATEGORIA

**Estética**

SEÇÕES

**1**

## Conteúdo

1- Objetivo O Sculptra® é um bioestimulador de colágeno injetável composto por ácido poli-L-láctico (PLLA), indicado para o tratamento de flacidez, perda de sustentação e melhora da qualidade da pele (rosto, pescoço, colo, abdômen, glúteos). A técnica asséptica envolve a reconstituição do produto e aplicação subdérmica para estimular fibroblastos, oferecendo resultados graduais e duradouros. 2- Áreas de Aplicação Facial e corporal. 3- Responsabilidades Biomedica Esteta 4- Materiais utilizados: Descrição Quant. Mínima. (unid.) Touca 1 Mascara 1 Luva 1 Algodão ou Gaze 1 Clorexidina nao alcoolica 1 Sculptra 1 Água para Injeção 10 ml 1 Lápis Dermatografico 1 Seringa 3 - 5 ou 10 ml 1 Agulha 22g ou 18g 1 Agulha 21g pertuito 1 Canula 22g 1 Anestesico Lidocaina 1 5- Descritivo da Execução

1. Higienizar o frasco de Sculptra® com clorexidina.
  2. Adicionar 5 mL de água estéril para injetáveis ao frasco.
  3. Agitar vigorosamente por cerca de 1 minuto até obter uma suspensão uniforme e translúcida.
  4. O produto deve ser reconstituído com antecedência (recomendado pelo fabricante: mínimo de 2 horas antes, idealmente mais tempo para melhor hidratação).
- O paciente deve ser recebido pelo profissional biomedico, na qual o mesmo deve realizar uma anamnese previa, entender quais as queixas do paciente, explicar detalhadamente como sera realizado o procedimento e quais os cuidados que devem ser seguidos apos a aplicacao.
6. Técnica de Aplicação
    1. Realizar higienização da área onde sera aplicado o tratamento;
    2. Realizar a marcação dos pontos de acordo com a queixa do paciente e da expertise profissional;
    3. Aplicar anestesico injetavel no ponto de entrada da canula;
    4. Realizar pertuito no local desejado;
    5. Aplicar o produto na camada subdérmica (profunda), utilizando cânula, depositando pequenas quantidades em leque e com destreza;
    6. Respeitar a sensibilidade de dor do paciente;
    7. Aplicar em todas as areas demarcadas.
  7. Cuidados Pós-Procedimento (Regra 5-5-5).
    1. Instruir o paciente a realizar massagens na área tratada por 5 minutos, 5 vezes ao dia, durante 5 dias, para evitar a formação de nódulos ou pápulas.
    2. Evitar exposição ao sol e calor intenso até que o inchaço desapareça.

3. Compressas frias podem ser usadas para reduzir edema.

8- Reações Adversas: • Inchaço, hematomas, dor local, regioa febril; 9- Anexo Foto 1: Sculptra, laboratorio Galderma.

